



TERMINURIC

REDUZ O EXCESSO DE ÁCIDO
ÚRICO NO CORPO HUMANO



ANTIOXIDANTE




SAÚDE DAS
ARTICULAÇÕES



CONTROLE DOS NÍVEIS
DE ÁCIDO ÚRICO

A gota é uma forma de artrite inflamatória causada por uma desordem metabólica (hiperuricemia) que leva à deposição de cristais de ácido úrico em tecidos e fluidos dentro do corpo. Os fatores de risco relacionados à gota incluem: excesso de peso ou obesidade, hipertensão, ingestão de álcool, uso de diuréticos, dieta rica em purina e frutos do mar além do funcionamento inadequado dos rins.

O surgimento do quadro agudo ocorre quando os cristais de urato presentes nas articulações provocam inflamação, caracterizada por dor, vermelhidão, inchaço e calor. Em relação ao quadro crônico, é caracterizado por artrite crônica, com dores nas juntas.



Terminuric é derivado da planta *Terminalia Bellerica*, tendo como compostos bioativos os taninos, particularmente, em condições como a artrite e a gota. **Terminuric** possui atividade anti-inflamatória devido à inibição da enzima xantina oxidase, além de ser um potente agente antioxidante.



AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO EXTRATO AQUOSO DA *TERMINALIA CHEBULA* E *TERMINALIA BELLERICA* EM INDIVÍDUOS COM HIPERURICEMIA

Um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, foi realizado ao longo de 24 semanas, para avaliar a eficácia dos extratos de *Terminalia chebula* (500mg/dia); Terminuric (500mg/dia), Terminuric (250mg/dia) e Febuxostate (40mg/dia) no tratamento de 88 pacientes portadores de hiperuricemia.

Ao final de 24 semanas de tratamento o grupo Terminuric (500mg) apresentou uma redução de 27% nos níveis de ácido úrico perdendo apenas para o grupo Febuxostate (40mg) que foi de 48% (Figura 1). Portanto o uso de **Terminuric** é uma alternativa natural, sem causar efeitos colaterais para auxiliar no controle dos níveis de ácido úrico e tratamento da Gota.




Figura 1: Alteração Percentual média nos níveis de ácido úrico após o tratamento.



SUGESTÃO DE FORMULAÇÃO

Tratamento da hiperuricemia

Ativo	Concentração
Terminuric	500mg

Modo de usar: Tomar 1 dose ao dia.

Concentração recomendada: **500mg ao dia.**

Referências bibliográficas

Terkeltaub RA. Gout. N Engl J Med. 2003;349(17):1647–1655.

Usharani P, Nutalapati C, Pokuri V, Kumar U, Taduri G. A randomized, double-blind, placebo-, and positive-controlled clinical pilot study to evaluate the efficacy and tolerability of standardized aqueous extracts of Terminalia chebula and Terminalia bellerica in subjects with hyperuricemia. Clinical Pharmacology: Advances and Applications. 22 June 2016 Volume 2016:8 Pages 51—59.

Exija o selo de autenticidade



Vendas:

0800 775 5718 • (11) 2067 5718

www.viafarmanet.com.br



INOVAÇÃO E QUALIDADE,
JUNTOS NA MESMA VIA