Produto	Verapamil (princípio-ativo incluído na RDC 354, de 18 de dezembro de 2003 – Substâncias de baixo índice terapêutico).
CAS	152-11-4
Fórmula molecular	C_{27} H_{38} N_2O_4, HCl
Indicações	Esse medicamento é utilizado no tratamento da pressão alta, no tratamento de palpitações e da dor no peito por falta de oxigenação cardíaca (angina) e na prevenção da enxaqueca.
Dosagem	120 a 240mg de 24/24h.
Contra-indicações	• Não usar durante a gravidez e amamentação, pois não se conhece os risco que a criança pode correr; • Pacientes que têm arritmias cardíacas (bradicardia, síndrome deWolf-Parkinson-White); • Pacientes com problemas no fígado e nos rins; • Pacientes com alergias ao medicamento; • Pacientes com prisão de ventre crônica.
Reações adversas	Geralmente é bem tolerado, porém alguns pacientes podem apresentar constipação intestinal, distúrbios gástricos, vertigem, fraqueza, nervosismo, hipotensão ortostática e cefaléia. Raramente tem ocorrido hipotensão grave e bradicardia, geralmente relacionadas com a injeção intravenosa.
Interações medicamentosas	Os efeitos do Verapamil podem ser aumentados pelos seguintes medicamentos: Propranolol, Atenolol, Metoprolol, Esmolol, Timolol, Nadolol, Pindolol, Bucindolol, Carvedilol, Bisoprolol, Sotalol), Amiodarona, Sildenafil,Eritromicina, Claritromicina, Azitromicina, Atazanavir, Cetoconazol, Fluconazol, Ciprofloxacino, Doxiciclina, Propofol, Quinidina, podendo diminuir a pressão arterial, causando tontura, vermelhidão e palpitações. Os efeitos do Verapamil podem ser diminuídos pelos seguintes medicamentos: Fenitoína, Fenobarbital, Carbamazepina e Rifampicina. Evite usar a erva de São Cristóvão (cimicífuga racemosa), derivados da papoula, alho, espinheiro-alvar, caramujo, bolsa de pastor, pois podem ter diminuir a pressão e causar mal estar. Durante o tratamento com o Verapamil é preciso evitar o consumo de bebidas cítricas industrializadas (exemplo: Schwepes citrus®, Fanta citrus®,Tampico®). Essas bebidas aumentam a concentração do medicamento no sangue, podendo causar queda da pressão. Durante o tratamento com o Verapamil é preciso evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

MATRIZ - R. Jurupari, 775 - Jd. Oriental - Cep 04348-070 - São Paulo - SP
COMERCIAL - Av. Dr. Hugo Beolchi, 445 - 14º andar - Vl. Guarani - Cep 04310-030 - São Paulo - SP
Tel.:11 5033-3700 - Fax: 11 5033-3711 - fagron@fagron.com.br - www.compoundingmatters.com

Conservação	Manter em ambiente seco e fresco.
Bibliografia	1. The Merck Index: Editora Merck & Co, INC 12ªedição, 1996, Pág. 375.

MATRIZ - R. Jurupari, 775 - Jd. Oriental - Cep 04348-070 - São Paulo - SP
COMERCIAL - Av. Dr. Hugo Beolchi, 445 - 14º andar - Vl. Guarani - Cep 04310-030 - São Paulo - SP
Tel.:11 5033-3700 - Fax: 11 5033-3711 - fagron@fagron.com.br - www.compoundingmatters.com